



Circuncisiones en UW Neighborhood Clinics (clínicas del vecindario de UW)

Muchas clínicas de UW Medicine Neighborhood hacen circuncisiones como procedimiento ambulatorio. Respetamos la decisión de la familia sobre circuncidar o no a su hijo recién nacido.

La circuncisión y su bebé

La *circuncisión* es una cirugía que extirpa del 25 al 50% del prepucio del pene. Por lo general se hace en las primeras semanas de vida del recién nacido.

Toma alrededor de 20 minutos. La cicatrización demora de 7 a 10 días. Un bebé debe estar sano para que se le practique la circuncisión de forma segura.



La circuncisión se hace por lo general en las primeras semanas de vida del recién nacido.

Los estudios científicos muestran que la circuncisión tiene algunos beneficios para la salud. En el año 2012 la Academia Americana de Pediatría (AAP) afirmó que estos beneficios superan los riesgos.

Los padres eligen lo que es mejor para su hijo. Algunos padres hacen circuncidar a sus hijos por motivos religiosos, sociales o culturales. Otros eligen no hacerlo por razones similares. Consulte los beneficios y riesgos de la circuncisión a continuación y en la página siguiente.

Beneficios y riesgos de la circuncisión

Beneficios

- Un riesgo menor de infección de las vías urinarias (IVU).
- Un riesgo menor de contraer cáncer del pene. Sin embargo, este tipo de cáncer es muy raro, tanto si el varón está circuncidado o no.
- Un riesgo levemente más bajo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VPH y VIH, el virus del SIDA.
- Prevención de la infección del prepucio.



Para coordinar una cita para la circuncisión de su bebé, llame al Centro de Contacto de UW Medicine al 206-520-5000.

- Prevención de la *fimosis* , una afección en los varones no circuncidados que evita la *retracción* del prepucio (retirar).
- Es más fácil mantener limpia la zona genital.

Riesgos

- Como con cualquier cirugía, la circuncisión tiene algunos riesgos. Las complicaciones de la circuncisión son raras y la mayor parte de las veces son leves. Algunas complicaciones son: sangrado, infección, corte del prepucio muy corto o muy largo y cicatrización incorrecta. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención a la salud sobre las complicaciones posibles.
- Cuando se quita el prepucio, es más fácil que la punta del pene se irrite. Esto puede hacer que el orificio del pene se vuelva muy pequeño. Muy pocas veces, esto causa problemas de micción (para orinar) que podrían tener que corregirse quirúrgicamente.
- Algunas personas consideran que la circuncisión hace que la punta del pene sea menos sensible, causando una disminución en el placer sexual posteriormente en la vida. Esto no se ha demostrado por ningún estudio médico ni psicológico.

Planificación de la circuncisión en UW Medicine

Si opta por la circuncisión, nos aseguraremos de que su bebé esté lo más cómodo y seguro posible. Ofrecemos apoyo y medicamentos para aliviar las molestias de este procedimiento.

Aunque es un procedimiento breve, planifique estar en la clínica al menos durante 1½ a 2 horas, para permitir que se brinde atención completa a su bebé. Queremos asegurarnos de que su bebé esté bien antes de que se vaya.

Por favor coordine una cita lo antes posible luego del parto. Preferimos que los bebés tengan **hasta 3 semanas** . Pregunte a su compañía de seguros si cubre las circuncisiones. Muchas compañías de seguro no las pagan. Si su plan de seguro no cubre la circuncisión, debe pagarla cuando se efectúa este procedimiento.

¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Si tiene preguntas sobre la circuncisión, llame a su proveedor de atención a la salud durante el horario de oficina.

Centro de Contacto de UW Medicine:
206-520-5000

Para obtener más información

Para obtener más información sobre la circuncisión, visite estos sitios web:

American Academy of Pediatrics
(Academia Americana de Pediatría).....www.aap.org

American Academy of Family Physicians
(Academia Americana de Médicos de Familia).....www.aafp.org

Family Doctor (Médico de Familia).....www.familydoctor.org

Healthy Children.....www.healthychildren.org

Circumcisions at UW Neighborhood Clinics

Many UW Medicine Neighborhood Clinics do circumcisions as an outpatient procedure. We respect a family's choice about whether or not to have their newborn son circumcised.

Circumcision and Your Baby

Circumcision is a surgery that removes 25% to 50% of the foreskin of the penis. It is usually done in the first few weeks of a baby boy's life.

A circumcision takes about 20 minutes. Healing takes 7 to 10 days. A baby must be healthy to be circumcised safely.

Studies show there are health benefits of circumcision.

In 2012, the American Academy of Pediatrics (AAP) stated that these health benefits outweigh the risks.

Parents choose what is best for their child. Some parents have their sons circumcised for religious, social, or cultural reasons. Others choose not to for similar reasons. See the benefits and risks of circumcision below and on the next page.



A circumcision is usually done in the first few weeks of a baby boy's life.

Benefits and Risks of Circumcision

Benefits

- A lower risk of urinary tract infections (UTIs).
- A lower risk of getting cancer of the penis. But, this type of cancer is very rare, whether or not a male is circumcised.
- A slightly lower risk of getting sexually transmitted infections (STIs) including HPV and HIV, the AIDS virus.
- Prevention of foreskin infections.



To make an appointment for your baby's circumcision, please call the UW Medicine Contact Center at 206-520-5000.

- Prevention of *phimosis*, a condition in uncircumcised males that prevents foreskin *retraction* (pulling back).
- Easier to keep the genital area clean.

Risks

- As with any surgery, circumcision has some risks. Complications from circumcision are rare, and most times they are minor. Bleeding, infection, cutting the foreskin too short or too long, and improper healing are some complications. Be sure to talk with your health care provider about possible complications.
- When the foreskin is removed, it may be easier for the tip of the penis to become irritated. This may cause the opening of the penis to become too small. Rarely, this can cause urination problems that may need to be corrected with surgery.
- Some people believe that circumcision makes the tip of the penis less sensitive, causing a decrease in sexual pleasure later in life. This has not been proven by any medical or psychological study.

Planning for Circumcision at UW Medicine

If you choose a circumcision, we will make sure that your baby is as comfortable and safe as possible. We give caring support and medicines to relieve the discomfort of this procedure.

Even though this is a short procedure, plan to be at the clinic for at least 1½ to 2 hours to allow complete care for your baby. We want to make sure your baby is fine before you leave.

Please make your appointment as soon as possible after you give birth. We prefer to see infants **up to 3 weeks of age**. Ask your insurance company if it covers circumcisions. Many insurance companies do not pay for them. If circumcision is not covered by your insurance plan, you must pay for it at the circumcision appointment.

To Learn More

To learn more about circumcisions, visit these websites:

- American Academy of Pediatrics..... www.aap.org
- American Academy of Family Physicians..... www.aafp.org
- Family Doctor..... www.familydoctor.org
- Healthy Children..... www.healthychildren.org

Questions?

Your questions are important. If you have questions about circumcision, call your health care provider during office hours.

UW Medicine Contact Center: 206-520-5000